

## 第7講 変数をキーにした分析 (1)

田中重人 (東北大学文学部准教授)

[テーマ] 対応のある項目間の比較

### 1 変数間の関連と比較

- 類似性・因果関係 → 相関係数行列
- どの変数がより高い／低い? → 変数をキーにした分析 (対応のある分析、被験者内要因)
  - 例: 問 27 の 8 項目のうち、最も「重要」と評価されているもの／されていないものはどれか?

とりあえず、平均値を並べて比較するには:

SPSS では「分析」→「記述統計」→「記述統計」で多くの変数の平均値 (と標準偏差) を並べて出力できる。

### 2 「対応」とは

同一ケースが複数の項目に回答している場合、**項目間に「対応」がある** という。

このような項目の比較には、対応を考慮した分析法を使う必要がある。

例題: つぎのような 3 ケース × 2 変数 のデータについて、どちらの変数が大きくなる傾向にあるかを考えてみよう:

	変数 A		変数 B	差
ケース X	4	-	5	=
ケース Y	3	-	4	=
ケース Z	5	-	1	=

平均値

多数決をとると?

このように、ケース間の**異質性が大きい**場合は、対応を考慮して分析しないと、データの特徴をつかみそこねる可能性がある。

### 3 ふたつの変数での大小の比較

#### 3.1 例題

「A. 高い収入」 vs. 「B. 家族からの信頼・尊敬」 …… どちらが大切?

→ A>B の人と A<B の人のどちらが多いか?

これら 2 つ以外に A=B の人がいるから、これをどうあつかうかが問題になる。

## 3.2 符号検定

「符号検定」(sign test) とは…

1.  $A = B$  のケースを除外
2. 帰無仮説: 「母集団では同数」 (=50%)
3. 正規分布を利用して検定をおこなう

※ この考えかたは、比率の区間推定とおなじものなので、比率  $\pm$  臨界値  $\times$  標準誤差 で信頼区間を求めていると考えてもよい

## 3.3 SPSS コマンド

- 「ノンパラメトリック検定」  $\rightarrow$  「2個の対応サンプルの検定」
- 比較したい変数をペアで指定する
- 「符号検定」をチェック

## 4 課題

適当な2変数について、符号検定を行う。クロス表 (または相関図) も出力して、結果を解釈すること。ISTU で来週水曜正午まで。

## 文献

参考 URL :

<http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/lecture/Average/sign-test.html> 青木繁伸: 符号検定の簡潔な説明

<http://kusuri-jouhou.com/statistics/fugou.html> 役に立つ薬の情報~専門薬学: 架空データによる符号検定の説明: 小標本 / 大標本